# AG seed
ARGENTINA

UNA DECISIÓN INTELIGENTE



AG-seed.com.ua

2026

Asociacion
Semilleros
Argentinos

# ПРО КОМПАНІЮ

**AGseed®** — аргентинська компанія з портфоліо продуктів високої продуктивності та якості, що супроводжує аргентинського виробника.
З більш ніж 30-річним досвідом і з бажанням завжди продовжувати досліджувати та розвивати наші продукти, займаючи важливе місце на місцевому ринку та поступово експортуючи нашу генетику у світ.







Протягом кількох років ми працюємо над підвищенням якості кожного процесу, оскільки вважаємо їх принципово важливими для отримання високоякісного насіння. Наша передумова номер один полягає в тому, щоб товар надходив до наших клієнтів у відмінній якості.

Ми відрізняємося диференційованим ставленням до кожного з наших клієнтів:
Швидка відповідь на запитання та/або проблеми.
Прямий контакт Комерційної мережі з керівниками кожного відділу.
Висока рентабельність, відмінне співвідношення ціна/якість.
Посівний материал AGseed допомагає українським аграріям отримувати стабільно високий урожай завдяки лінійці гібридів, які максимально адаптовані до різних зон вирощування



У дослідницькому центрі **AGseed** створюють гібриди (кукурудза, соняшник, сорго, ріпак) і сорти (пшениці), а також здійснюють трансформацію ліній кукурудзи та соняшнику за допомогою біотехнологічних заходів. Зараз у нас є 100% власна генетика соняшника, ріпаку, кукурудзи, сорго та пшениці (соняшник та кукурудза є переважними культурами).








Ми маємо широку мережу дистриб'юторів по всій країні, а також представників у Парагваї, Уругваї, Бразилії, Судані, Китаї, Алжирі, Марокко та Південній Африці, зараз ми робимо перші вступні кроки в Сполучених Штатах та Україні.

Турбота про посіви

Стійкість до розповсюджених захворювань

Міцні паростки та відмінна якість




Імпортне насіння

Адаптивність

Максимальна урожайність

AG seed
ARGENTINA

## Чому обирають саме нас

- Індивідуальний агрономічний підхід до кожного клієнта Все насіння соняшника, ріпаку та кукурудзи швидко пристосовується до змін кліматичних умов і навколишнього середовища.
- Чудова якість аргентинської селекції, Ви зможете підібрати насіння соняшнику, кукурузи та ріпаку, що найкраще підходять для Вашого регіону.
- При дотриманні рекомендацій по термінах і догляді за гібридами, демонструють стабільно Високу Врожайність.

# Наша продукція

**Гібриди соняшника**

**Гібриди кукурудзи**

**Гібриди ріпаку**

# Соняшник

Як вибрати оптимальний гібрид?

Вирішуючи, яке насіння соняшнику вибрати, набагато важливіше враховувати кліматичні особливості регіону, умови землеробства та обрану технологію вирощування. Тому слід визначитися із термінами дозрівання. Для зручності аграріїв посів насіння соняшнику розділений ще на кілька категорій:

Ранньостиглий – з терміном дозрівання до 80-90 діб;
Середньоранній – 90-110 днів;
Середньостиглий – 110-120 діб з моменту появи дружних сходів;
Пізньостиглий – дозрівають більш ніж через 120 днів.

Чому саме соняшник?

Насправді вибір фермерів обґрунтований економічною ситуацією. У соняшника показник рентабельності найвищий проти інших культур.
При виборі гібрида також варто враховувати відомості, що надаються виробником. Важлива агротехніка для вирощування соняшнику, сівозміна, своєчасність та періодичність культивації ґрунту, терміни сівби соняшнику та інші фактори.

Також важливо при виборі враховувати і технологію, яку ви плануєте використовувати, вони діляться на три категорії:

Класичний - це стандартні гібриди із високим показником урожайності. Вони оптимальні для вирощування на полях із малою кількістю бур'янів.
Під Євролайтінг - це насіння, стійке до гербіцидів на основі імазапіру та імазамоксу. Така технологія обіцяє зниження витрат, адже спецзасіб вноситься одноразово за весь термін вегетації. В результаті, чисельність бур'янів, включаючи вовчка, під контролем.
Під Гранстар - такі культури є стійкими до трибенурон-метилу. Це дозволяє без шкоди використовувати агрохімію, що впливає на дводольні польові рослини.

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ

| | | Класичні гібриди | | | | Express гібриди | | | Clearfield гібриди | | | Високоолеїнові гібриди | Clearfield plus | Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Назва гібрида | VELLON | LANIN | TROMEN | ZONDA | LAGUNA | BRISA | ARIZARO | CHIMPA | VILAMA | PAMPERO | EL TORO | GAUCHO | FALSO |
| Група стиглості | Тип гібриду | Кондитерський | Лінолевий | Лінолевий | Лінолевий | Лінолевий | Лінолевий | Лінолевий | Лінолевий | Лінолевий | Лінолевий | Високоолеїновий | Лінолевий | Лінолевий |
| | Група стиглості | Середньоранній | Середньоранній | Середньоранній | Середньоранній | Середньостиглий | Середньоранній | Середньоранній | Ранньостиглий | Середньоранній | Середньостиглий | Середньоранній | Середньоранній | Середньоранній |
| | Період вегитації (днів) | 104-110 | 106-112 | 100-108 | 106-112 | 110-116 | 106-112 | 108-114 | 86-90 | 100-108 | 110-114 | 106-112 | 96-104 | 108-112 |
| Вміст та тип олії | Вміст олії / олеїнової кислоти % | 32% | 53% | 51% | 50% | 51% | 52% | 51% | 50% | 50% | 51% | 50% 85-89% | 51% | 52% |
| Толерантність до обмежуючих факторів під час вегетації | Вовчок | G | F | G | G | F | G | G | F | G | E | F | G | F |
| | Іржа | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Несправжня борошниста роса(RM) | RM9 | RM9 | RM7 | RM8 | RM9 | RM8 | RM9 | RM9 | RM8 | RM9 | RM9 | RM9 | RM9 |
| | Фомопсис | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| | Вертицильоз | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| | Склеротиніоз | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| | Вилягання | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| | Посухостійкість | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Технологія вирощування | Толерантість до гербицидів | - | - | - | - | Express | Express | Express | Clearfield | Clearfield | Clearfield | Clearfield | Clearfield plus | Express/ Clearfield |
| | Тип розвитку | Помірно-інтенсивний | Інтенсивний | Екстенсивний | Помірно-інтенсивний | Інтенсивний | Помірно-інтенсивний | Помірно-інтенсивний | Помірно-інтенсивний | Екстенсивний | Інтенсивний | Помірно-інтенсивний | Помірно-інтенсивний | Помірно-інтенсивний |
| Густота рослин на 1 га до збору | Достатнє зволоження | 34-37 000 | 60-65 000 | 60-65 000 | 60-65 000 | 60-65 000 | 55-60 000 | 55-60 000 | 60-65 000 | 55-60 000 | 60-65 000 | 60-65 000 | 60-65 000 | 60-65 000 |
| | Недостатнє зволоження | 30-34 000 | 55-60 000 | 50-55 000 | 50-55 000 | 50-55 000 | 50-55 000 | 50-55 000 | 50-55 000 | 50-55 000 | 50-55 000 | 50-55 000 | 50-55 000 | 55-60 000 |
| | Бали(1-9) | | | | NEW | | NEW | | | | NEW | | NEW | |

AG seed
ARGENTINA

GIRASOL HIBRIDO

# VELLON

## ТАНДЕМ ВРОЖАЙНОСТІ ТА АДАПТИВНОСТІ

КОНДИТЕРСЬКИЙ СЕРЕДНЬОРАННІЙ

### ВИСОКА ЯКІСТЬ ЗЕРНА
за різних погодних сценаріїв під час вегетації

### ВІДМІННО ТРИМАЄ ПОСУХУ
підходить для використання на ядро, кормових і харчових цілей.

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 30-34 000 | 34-37 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Північний Степ | |

ТИП: Кондитерський

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ ---


СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА G

ВМІСТ ОЛІЇ 32%

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9



Іржа

Несправжня борошниста роса (RM)

Фомопсис

Вертицильоз


Склеротиніоз

Вилягання

Посухостійкість

Адаптація до умов вирощування: Підходить для регіонів з обмеженим зволоженням.
Стійкість до стресів: Добре витримує посуху, забезпечуючи стабільний урожай навіть у складних умовах.
Обробка насіння: Покриття фунгіцидами та інсектицидами для захисту від хвороб і шкідників.

## РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



AG seed
ARGENTINA

GIRASOL HIBRIDO

# LANIN

## ТАНДЕМ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ОЛІЙНОСТІ

ЛІНОЛЕВИЙ СЕРЕДНЬОРАННІЙ 106-112 днів

### СТАБІЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
за різних погодних сценаріїв під час вегетації

### ВІДМІННИЙ ФІТОСАНІТАРНИЙ ПРОФІЛЬ
завдяки високій витривалості до усіх основних хвороб

ТИП: ІНТЕНСИВНИЙ

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ ---

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА F


ВМІСТ ОЛІЇ 53%

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 55-60 000 | 60-65 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Північний Степ | |

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


БАЛИ 1-9



Іржа
Несправжня борошниста роса (RM)
Фомопсис
Вертицильоз
Склеротиніоз
Вилягання
Посухостійкість

Потенціал врожайності 55 ц/га
Висота рослини - невисока
Нахил кошика - напівприпіднятий

### РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



AG seed
ARGENTINA

GIRASOL HIBRIDO

# TROMEN

## ДЛЯ НАДСКЛАДНИХ УМОВ

ЛІНОЛЕВИЙ СЕРЕДНЬОРАННІЙ 100-108 днів

### СТАБІЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
відповідні результати за будь-яких умов

### УСІ ПЕРЕВАГИ ЕКСТЕНСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
поєднання урожайності та стійкості в надскладних умовах

ТИП: ЕКСТЕНСИВНИЙ

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ ---

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА G


ВМІСТ ОЛІЇ 51%

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 50-55 000 | 60-65 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Лісостеп, Степ | |

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


БАЛИ 1-9



Іржа
Несправжня борошниста роса (RM)
Фомопсис
Вертицильоз
Склеротиніоз
Вилягання
Посухостійкість

Потенціал врожайності 45-50 ц/га
Висота рослини - середня
Нахил кошика - похилий

### РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



AG seed
ARGENTINA

GIRASOL HIBRIDO

# ZONDA

## ДИНАМІЧНИЙ ТА АДАПТИВНИЙ

ЛІНОЛЕВИЙ СЕРЕДНЬОРАННІЙ 106-112 днів

## СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ПІВДЕНИХ РЕГІОНІВ
придатний до вирощування в засушливих умовах

## АРГЕНТИНСЬКИЙ ЗАХИСТ ВІД ВОВЧКУ

ТИП: ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ ---

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА G


ВМІСТ ОЛІЇ 50%

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 50-55 000 | 60-65 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Лісостеп, Степ | |

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


БАЛИ 1-9



Іржа
Несправжня борошниста роса (RM)
Фомопсис
Вертицильоз
Склеротиніоз
Вилягання
Посухостійкість

Потенціал врожайності 48 ц/га
Висота рослини - середня
Нахил кошика - злегка нахилена

## РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



AG seed
ARGENTINA

GIRASOL HIBRIDO

# LAGUNA

## НОВА ЕПОХА ВРОЖАЮ

ЛІНОЛЕВИЙ СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ 110-116 днів

### ВИСОКИЙ РІВЕНЬ УРОЖАЙНОСТІ
в усіх кліматичних зонах України

### АДАПТИВНІСТЬ ДО ВСІХ ТИПІВ ҐРУНТІВ
найкращу віддачу забезпечує на родючих ґрунтах

ТИП: ІНТЕНСИВНИЙ

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ EXPRESS

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА F


ВМІСТ ОЛІЇ 51%

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 50-55 000 | 60-65 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Північний Степ | |

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

### АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


БАЛИ 1-9



Іржа
Несправжня борошниста роса (RM)
Фомопсис
Вертицильоз
Склеротиніоз
Вилягання
Посухостійкість

Потенціал врожайності 55 ц/га
Висота рослини - висока
Нахил кошика - похилий

### РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



AG seed
ARGENTINA

GIRASOL HIBRIDO

# BRISA

## ПІВНІЧНИЙ БРІЗ

ЛІНОЛЕВИЙ СЕРЕДНЬОРАННІЙ 106-112 днів

### ПОЄДНАННЯ СТІЙКОСТІ ТА УРОЖАЙНОСТІ
прекрасно адаптован до посушливих регіонів з агресивною атакою вовчка раси G

### ВИСОКА АДАПТИВНІСТЬ
до всіх типів ґрунтів

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 50-55 000 | 55-60 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Північний Степ | |

ТИП: ЕКСТЕНСИВНИЙ

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ EXPRESS


СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА G

ВМІСТ ОЛІЇ 52%

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9



Іржа

Несправжня борошниста роса (RM)

Фомопсис

Вертицильоз


Склеротиніоз

Вилягання

Посухостійкість

Потенціал врожайності 52 ц/га
Висота рослини - середня
Нахил кошика - похилий

## РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



AG seed
ARGENTINA

GIRASOL HIBRIDO

# ARIZARO

## ЛИЦАР У ЛАТАХ

ЛІНОЛЕВИЙ СЕРЕДНЬОРАННІЙ 108-114 днів

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА ПОЄДНАНА З ТЕХНОЛОГІЄЮ ЕКСПРЕСС

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ
має хорошу продуктивність навіть під впливом посухи

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 50-55 000 | 55-60 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Північний Степ | |

ТИП: ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ EXPRESS

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА G

ВМІСТ ОЛІЇ 51%

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9



Іржа

Несправжня борошниста роса (RM)

Фомопсис

Вертицильоз


Склеротиніоз

Вилягання

Посухостійкість

Потенціал врожайності 45-50 ц/га
Висота рослини - середня
Нахил кошика - злегка похилий

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



AG seed
ARGENTINA

GIRASOL HIBRIDO

# CHIMPA

НЕ ГАЙТЕ ЧАС

ЛІНОЛЕВИЙ | РАННЬОСТИГЛИЙ | 86-90 днів

## СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЇ ЧАСУ
адаптований під всі типи ґрунтів

## ЛЕГКА ІНТЕГРАЦІЯ У ПОСІВНУ ПЛОЩУ
для пізніх посівів або для легкого збирання перед озимими культурами

ТИП: ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ Clearfield® Виробнича система

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА F


ВМІСТ ОЛІЇ 50%

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 50-55 000 | 60-65 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Північний Степ | |

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


БАЛИ 1-9



Іржа
Несправжня борошниста роса (RM)
Фомопсис
Вертицильоз
Склеротиніоз
Вилягання
Посухостійкість

Потенціал врожайності 40-45 ц/га
Висота рослини - висока
Нахил кошика - злегка нахилена

## РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



AG seed
ARGENTINA

GIRASOL HIBRIDO

# VILAMA

## БОРЕЦЬ З АГРОФОНОМ

ЛІНОЛЕВИЙ СЕРЕДНЬОРАННІЙ 100-108 днів

### ВИТРИМУЄ НИЗЬКИЙ АГРОФОН
відмінно розкриває потенціал у посушливих умовах

### НАЙВИЩА СТАБІЛЬНІСТЬ
продуктивний скрізь та за будь-яких умов

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 50-55 000 | 55-60 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Лісостеп, Степ | |

ТИП: ЕКСТЕНСИВНИЙ

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ Clearfield® Виробнича система


СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА G

ВМІСТ ОЛІЇ 50%

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9



Іржа

Несправжня борошниста роса (RM)

Фомопсис

Вертицильоз


Склеротиніоз

Вилягання

Посухостійкість

Потенціал врожайності 50-55 ц/га
Висота рослини - середня
Нахил кошика - злегка похилий

## РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



AG seed ARGENTINA

GIRASOL HIBRIDO

# PAMPERO

## СИЛА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ЛІНОЛЕВИЙ СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ 110-114 днів

### ЛІДЕР УРОЖАЙНОСТІ №1
високий потенціал урожайності
здатний досягти 5 т/га та більше

### ВИБІР АГРОНОМА
найврожайніший гібрид для виробничої системи Clearfield ®

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 50-55 000 | 60-65 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Північний Степ | |

ТИП: ІНТЕНСИВНИЙ

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ Clearfield® Виробнича система


СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА E

ВМІСТ ОЛІЇ 51%

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


БАЛИ 1-9



Іржа
Несправжня борошниста роса (RM)
Фомопсис
Вертицильоз
Склеротиніоз
Вилягання
Посухостійкість

Потенціал врожайності 56 ц/га
Висота рослини - середня
Нахил кошика - похилий

## РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



AG seed
ARGENTINA

GIRASOL HIBRIDO

# EL TORO

## УНІКАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ

ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ СЕРЕДНЬОРАННІЙ 106-112 днів

### АДАПТИВНІСТЬ ДО ВСІХ ТИПІВ ҐРУНТІВ
гарантія отримання очікуваних результатів

### ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ
завдяки Аргентинській генетиці соняшнику

ТИП: ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ Clearfield® Виробнича система

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА F

ВМІСТ ОЛІЇ 50%
та олеїнової кислоти до 89%

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 50-55 000 | 60-65 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Північний Степ | |

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

### АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


БАЛИ 1-9



Іржа
Несправжня борошниста роса (RM)
Фомопсис
Вертицильоз
Склеротиніоз
Вилягання
Посухостійкість

Потенціал врожайності 45-50 ц/га
Висота рослини - середня
Нахил кошика - похилий

### РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



AG seed
ARGENTINA

# GIRASOL HIBRIDO

## GAUCHO

## ПОЄДНАННЯ СИЛИ ТА ВРОЖАЮ

ЛІНОЛЕВИЙ | РАННЬОСТИГЛИЙ | 96-104 днів

### ПЛАСТИЧНИЙ ДО НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ
мінімальний обробіток ґрунту, пізні строки посіву

### НЕВИБАГЛИВИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ
показує хорошу пластичність і якість врожаю

ТИП: ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ Clearfield® Plus Виробнича система

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА G


ВМІСТ ОЛІЇ 51%

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 50-55 000 | 60-65 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Північний Степ | |

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


БАЛИ 1-9



Іржа
Несправжня борошниста роса (RM)
Фомопсис
Вертицильоз
Склеротиніоз
Вилягання
Посухостійкість

Потенціал врожайності 52 ц/га
Висота рослини - низька
Нахил кошика - напівпохилений

### РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



AG seed
ARGENTINA

GIRASOL HIBRIDO

# FALSO

**НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ РУБІЖ**

ЛІНОЛЕВИЙ СЕРЕДНЬОРАННІЙ 108-112 днів

## СТАБІЛЬНО ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ
підходить під технологію Multi

## РЕКОРДСМЕН УРОЖАЙНОСТІ
5,4 т/га зафіксована врожайність на демо-ділянці

ТИП: ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ

СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ Clearfield® Виробнича система

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА F


ВМІСТ ОЛІЇ 52%

| | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| Рекомендована густота до збирання (рос/га) | 55-60 000 | 60-65 000 |
| Рекомендована зона вирощування | Лісостеп, Північний Степ | |

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 3-5%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


БАЛИ 1-9



Іржа
Несправжня борошниста роса (RM)
Фомопсис
Вертицильоз
Склеротиніоз
Вилягання
Посухостійкість

Потенціал врожайності 50-55 ц/га
Висота рослини - середня
Нахил кошика - похилий

## РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 24-25 р.



# Кукурудза

Врожайність кукурудзи залежить від співвідношення даних з ФАО з вашими умовами землеробства, а також кліматичні умови протягом періоду вегетації. Багато фермерів вже встигли зіткнутися з проблемами під час вирощування цієї культури, але лише через помилки в виборі гібрида і технології його вирощування. Адже терміни посіву кукурудзи в Україні варіабельні і залежать від багатьох параметрів. Важливо враховувати регіон висадки, кліматичні умови та інші моменти. З таким підходом, будь який гібрид порадує врожаєм!

Україна багата різними ландшафтами, тому і час посадки насіння в різних регіонах нашої країни різниться. Якщо орієнтуватися на календар, то приблизні терміни посіву, для різних, зон такі:
степові або посушливі регіони Півдня України – середина квітня;
лісостепова, що охоплює центральні області, – кінець квітня;
лісова – завершення квітня/ початок травня.

Основним критерієм повинні бути кліматичні умови. Адже кожен гібрид кукурудзи має специфічні вимоги по температурі повітря і кількості вологи. Саме від цих показників залежить кількість і якість врожаю.
Також варто враховувати такі нюанси:
- продуктивність;
- густоту сівби;
- мета вирощування (на зерно або силос);
- терміни розвитку і дозрівання врожаю.

Для нашої країни оптимальними будуть гібриди, які мають показник по ФАО до 400. Для інших гібридів кліматичні умови не завжди підходять. Але при забезпеченні належного догляду і достатнього поливу, можна зібрати непоганий урожай поза сезоном.
Врахуйте: щоб отримати хороший урожай, важливо дотримуватися технологій. Тому висадку насіння слід проводити рівномірно, створюючи рекомендовані інтервали між рядами. Зазвичай вони рівні 70 см. Також не забувайте про норми за кількістю рослин на 1 га. Адже надто густа посадка призведе до суттєвого зменшення врожаю. Також подбайте про підвищення врожайності кукурудзи за допомогою гербіцидів та мікродобрив.

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДІВ КУКУРУЗИ

| | | Класичні гібриди кукурузи | | | | | | Yield Flexibility гібриди | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Назва гібрида | MORADO | REDONDO | AG 7094 | BLANCO | AG 8696 | TIPAS | AG 9270 | AG 9300 | AG 9320 |
| Група стиглості | ФАО | 220 | 260 | 280 | 310 | 330 | 340 | 270 | 300 | 320 |
| | Кількість рядків | 14-16 | 14-16 | 16-18 | 16-18 | 13-16 | 14-16 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| | Висота рослини | Середньо-низька | Середня | Середня | Низька | Висока | Середня | Середня | Середня | Середня |
| Врожайність | Генетичний потенціал | 16 т | 16 т | 16,8 т | 18 т | 18,7 т | 18,7 т | 18,5 т | 19 т | 19,5 т |
| Толерантність до обмежуючих факторів під час вегетації | Посухостійкіть | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| | Вологовіддача | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| | Стартовий ріст | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| | Вилягання | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| | No-till / Mini-till | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| | Монокультура | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| | Фузаріоз качана | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| | Пухирчаста сажка | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Летаюча сажка | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| Качан | Флексибільність | MED | MED | FLEX | MED | FLEX | MED | Y-FLEX | Y-FLEX | Y-FLEX |

AG seed
ARGENTINA

MAIZ HIBRIDO

# MORADO

## ВИБІР №1 ДЛЯ РАННЬОГО ВИСІВУ

РАННЬОСТИГЛИЙ ФАО 220

### ВІДМІННІ АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
при різних технологіях вирощування

### РАННЄ ЦВІТІННЯ
уникнення високих температур під час цвітіння

| | |
|---|---|
| Висота рослини: | середньонизька |
| Висота кріплення качана: | середня |
| Кількість рядів: | 14-16 |
| Кількість зерен у ряду: | 30-34 |
| Сума активних Tº до цвітіння: | 800ºC |
| Сума активних Tº до стиглості: | 1640ºC |

**Тип Зерна:** Кремнисто-зубоподібний

**Напрям використання:** Зерно


**Флексибільність качана:** MED

**Генетичний потенціал т/га:** 16т

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%


## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9




## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9




## РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА

| Ранній висів | | | | | | | Пізній висів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальний агрофон | Відмінний | Добрий | Недостатній | Недостатній | Добрий | Відмінний | Загальний агрофон |
| Насінин на метр* | 6,6 | 6,2 | 5,82 | 4,89 | 5,4 | 5,82 | Насінин на метр* |
| Насінин на Га | 94,444 | 88,888 | 83,333 | 70,000 | 77,777 | 83,333 | Насінин на Га |
| Мішків на Га | 1,31 | 1,23 | 1,15 | 0,97 | 1,07 | 1,15 | Мішків на Га |
| Рослин на Га** | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 63,000 | 70,000 | 75,000 | Рослин на Га** |

*Кількість насіння на метр при інтервалі між рядами 70 см
** Коефіцієнт втрат 10% відноситься до помилок посіву , із середньою схожістю 95%
*** Кількість насіння у посівній одиниці - 72 000

AG seed
ARGENTINA

MAIZ HIBRIDO

# REDONDO

## НЕЗЛАМНА СТАБІЛЬНІСТЬ

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ФАО 260

### ЧУДОВА АДАПТИВНІСТЬ
при різних технологіях вирощування

### АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ
швидкий стартовий ріст та толерантність до вилягання

| | |
|---|---|
| Висота рослини: | середня |
| Висота кріплення качана: | середня |
| Кількість рядів: | 14-16 |
| Кількість зерен у ряду: | 32-36 |
| Сума активних Tº до цвітіння: | 800ºC |
| Сума активних Tº до стиглості: | 1680ºC |

**Тип Зерна:** Кремнисто-зубоподібний

**Напрям використання:** Зерно

**Флексибільність качана:** MED

**Генетичний потенціал т/га:** 16т

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Вологовіддача
- Стартовий ріст
- Вилягання
- No-till та Mini-till
- Монокультура

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Фузаріоз качана
- Пухирчаста сажка
- Летаюча сажка

## РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА

| Ранній висів | | | | Пізній висів | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальний агрофон | Відмінний | Добрий | Недостатній | Недостатній | Добрий | Відмінний | Загальний агрофон |
| Насінин на метр* | 6,6 | 6,2 | 5,82 | 4,89 | 5,4 | 5,82 | Насінин на метр* |
| Насінин на Га | 94,444 | 88,888 | 83,333 | 70,000 | 77,777 | 83,333 | Насінин на Га |
| Мішків на Га | 1,31 | 1,23 | 1,15 | 0,97 | 1,07 | 1,15 | Мішків на Га |
| Рослин на Га** | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 63,000 | 70,000 | 75,000 | Рослин на Га** |

*Кількість насіння на метр при інтервалі між рядами 70 см
** Коефіцієнт втрат 10% відноситься до помилок посіву , із середньою схожістю 95%
*** Кількість насіння у посівній одиниці - 72 000

AG seed
ARGENTINA

MAIZ HIBRIDO FLEX

# AG 7094

СИЛА ГЕНЕТИКИ

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ФАО 280

## ПЛАСТИЧНІСТЬ ТА АДАПТАЦІЯ
адаптований під всі зони вирощування

## ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
надає гібриду адаптивність до посушливих умов

| | |
|---|---|
| Висота рослини: | середня |
| Висота кріплення качана: | середня |
| Кількість рядів: | 16-18 |
| Кількість зерен у ряду: | 30-34 |
| Сума активних Tº до цвітіння: | 850ºC |
| Сума активних Tº до стиглості: | 1700ºC |

**Тип Зерна:** Зубоподібний

**Напрям використання:** Зерно

**Флексибільність качана:** FLEX

**Генетичний потенціал т/га:** 16,8т

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Вологовіддача
- Стартовий ріст
- Вилягання
- No-till та Mini-till
- Монокультура

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Фузаріоз качана
- Пухирчаста сажка
- Летаюча сажка

## РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА

| Ранній висів | | | | Пізній висів | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальний агрофон | Відмінний | Добрий | Недостатній | Недостатній | Добрий | Відмінний | Загальний агрофон |
| Насінин на метр* | 6,6 | 6,2 | 5,82 | 5,04 | 5,4 | 5,82 | Насінин на метр* |
| Насінин на Га | 94,444 | 88,888 | 83,333 | 72,222 | 77,777 | 83,333 | Насінин на Га |
| Мішків на Га | 1,31 | 1,23 | 1,15 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | Мішків на Га |
| Рослин на Га** | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | Рослин на Га** |

*Кількість насіння на метр при інтервалі між рядами 70 см
** Коефіцієнт втрат 10% відноситься до помилок посіву , із середньою схожістю 95%
*** Кількість насіння у посівній одиниці - 72 000

AG seed
ARGENTINA

MAIZ HIBRIDO

# BLANCO

**ВИБІР АГРОНОМА**

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ ФАО 310

## ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА
завдяки генетичній особливості

## МОЖЛИВІСТЬ ПІЗНЬОГО ЗБИРАННЯ
завдяки гарному фітосанітарному стану рослин

| | |
|---|---|
| Висота рослини: | низька |
| Висота кріплення качана: | середня |
| Кількість рядів: | 16-18 |
| Кількість зерен у ряду: | 30-34 |
| Сума активних Tº до цвітіння: | 910ºC |
| Сума активних Tº до стиглості: | 1820ºC |

**Тип Зерна:** Кремнисто-зубоподібний

**Напрям використання:** Зерно

**Флексибільність качана:** MED

**Генетичний потенціал т/га:** 18т

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Вологовіддача
- Стартовий ріст
- Вилягання
- No-till та Mini-till
- Монокультура

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Фузаріоз качана
- Пухирчаста сажка
- Летаюча сажка

## РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА

| Ранній висів | | | | Пізній висів | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальний агрофон | Відмінний | Добрий | Недостатній | Недостатній | Добрий | Відмінний | Загальний агрофон |
| Насінин на метр* | 6,2 | 5,82 | 5,4 | 4,65 | 5,04 | 5,4 | Насінин на метр* |
| Насінин на Га | 88,888 | 83,333 | 77,777 | 66,666 | 72,222 | 77,777 | Насінин на Га |
| Мішків на Га | 1,23 | 1,15 | 1,07 | 0,92 | 1,00 | 1,07 | Мішків на Га |
| Рослин на Га** | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | Рослин на Га** |

*Кількість насіння на метр при інтервалі між рядами 70 см
** Коефіцієнт втрат 10% відноситься до помилок посіву , із середньою схожістю 95%
*** Кількість насіння у посівній одиниці - 72 000

AG seed
ARGENTINA

MAIZ HIBRIDO FLEX

# AG 8696

**ФЕНОМЕН ВРОЖАЮ**

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ ФАО 330

## ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ
високі результати незалежно від типу ґрунту та умов

## СИЛЬНА ГЕНЕТИКА
надає гібриду стійкість до основних хвороб

| | |
|---|---|
| Висота рослини: | висока |
| Висота кріплення качана: | середня |
| Кількість рядів: | 13-16 |
| Кількість зерен у ряду: | 36-40 |
| Сума активних Tº до цвітіння: | 940ºC |
| Сума активних Tº до стиглості: | 1860ºC |

**Тип Зерна:** Кремнисто-зубоподібний

**Напрям використання:** Зерно

**Флексибільність качана:** FLEX

**Генетичний потенціал т/га:** 18,7т

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Вологовіддача
- Стартовий ріст
- Вилягання
- No-till та Mini-till
- Монокультура

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Фузаріоз качана
- Пухирчаста сажка
- Летаюча сажка

## РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА

| Ранній висів | | | | | | | Пізній висів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальний агрофон | Відмінний | Добрий | Недостатній | Недостатній | Добрий | Відмінний | Загальний агрофон |
| Насінин на метр* | 5,8 | 5,4 | 5,04 | 4,50 | 4,8 | 5,2 | Насінин на метр* |
| Насінин на Га | 83,333 | 77,777 | 72,222 | 64,444 | 68,888 | 74,444 | Насінин на Га |
| Мішків на Га | 1,15 | 1,07 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 1,03 | Мішків на Га |
| Рослин на Га** | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 58,000 | 62,000 | 67,000 | Рослин на Га** |

*Кількість насіння на метр при інтервалі між рядами 70 см
** Коефіцієнт втрат 10% відноситься до помилок посіву , із середньою схожістю 95%
*** Кількість насіння у посівній одиниці - 72 000

AG seed
ARGENTINA

MAIZ HIBRIDO

# TIPAS

## ВРОЖАЙНІСТЬ НЕ МАЄ МЕЖ

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ ФАО 340

### ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ
завдяки максимальній кількості зерен у ряду

### ДОБРА ТОЛЕРАНТНІСТЬ
до стресових умов під час тривалої посухи

| | |
|---|---|
| Висота рослини: | середня |
| Висота кріплення качана: | середня |
| Кількість рядів: | 14-16 |
| Кількість зерен у ряду: | 36-40 |
| Сума активних Tº до цвітіння: | 950ºC |
| Сума активних Tº до стиглості: | 1880ºC |

**Тип Зерна:** Кремнисто-зубоподібний

**Напрям використання:** Зерно

**Флексибільність качана:** MED

**Генетичний потенціал т/га:** 18,7т

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Вологовіддача
- Стартовий ріст
- Вилягання
- No-till та Mini-till
- Монокультура

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Фузаріоз качана
- Пухирчаста сажка
- Летаюча сажка

## РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА

| Ранній висів | | | | | | | Пізній висів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальний агрофон | Відмінний | Добрий | Недостатній | Недостатній | Добрий | Відмінний | Загальний агрофон |
| Насінин на метр* | 5,8 | 5,4 | 5,04 | 4,50 | 4,8 | 5,2 | Насінин на метр* |
| Насінин на Га | 83,333 | 77,777 | 72,222 | 64,444 | 68,888 | 74,444 | Насінин на Га |
| Мішків на Га | 1,15 | 1,07 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 1,03 | Мішків на Га |
| Рослин на Га** | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 58,000 | 62,000 | 67,000 | Рослин на Га** |

*Кількість насіння на метр при інтервалі між рядами 70 см
** Коефіцієнт втрат 10% відноситься до помилок посіву , із середньою схожістю 95%
*** Кількість насіння у посівній одиниці - 72 000

AG seed
ARGENTINA

MAIZ HIBRIDO Y-FLEX

# AG 9270

## СТАБІЛЬНІСТЬ ТА АДАПТИВНІСТЬ

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ФАО 270

### СТАБІЛЬНІСТЬ ТА АДАПТАЦІЯ
адаптований під всі зони вирощування

### АДАПТИВНІСТЬ ДО ҐРУНТУ
надає гібриду адаптивність до всіх типів ґрунтів без втрати врожайності

| | |
|---|---|
| Висота рослини: | середня |
| Висота кріплення качана: | середня |
| Кількість рядів: | 16-18 |
| Кількість зерен у ряду: | 30-34 |
| Сума активних Tº до цвітіння: | 850ºC |
| Сума активних Tº до стиглості: | 1700ºC |

**Тип Зерна:** Кремнисто-зубоподібний

**Напрям використання:** Зерно

**Флексибільність качана:** Y-FLEX

**Генетичний потенціал т/га:** 18,5т

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Вологовіддача
- Стартовий ріст
- Вилягання
- No-till та Mini-till
- Монокультура

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Фузаріоз качана
- Пухирчаста сажка
- Летаюча сажка

## РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА

| Ранній висів | | | | | | | Пізній висів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальний агрофон | Відмінний | Добрий | Недостатній | Недостатній | Добрий | Відмінний | Загальний агрофон |
| Насінин на метр* | 6,6 | 6,2 | 5,82 | 5,04 | 5,4 | 5,82 | Насінин на метр* |
| Насінин на Га | 94,444 | 88,888 | 83,333 | 72,222 | 77,777 | 83,333 | Насінин на Га |
| Мішків на Га | 1,31 | 1,23 | 1,15 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | Мішків на Га |
| Рослин на Га** | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | Рослин на Га** |

*Кількість насіння на метр при інтервалі між рядами 70 см
** Коефіцієнт втрат 10% відноситься до помилок посіву , із середньою схожістю 95%
*** Кількість насіння у посівній одиниці - 72 000

AG seed
ARGENTINA

MAIZ HIBRIDO Y-FLEX

# AG 9300

## СИЛА ТА АДАПТИВНІСТЬ

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ ФАО 300

### ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ
високі та стабільні результати

### АДАПТИВНІСТЬ ДО ҐРУНТУ
надає гібриду адаптивність до всіх типів ґрунтів без втрати врожайності

| | |
|---|---|
| Висота рослини: | середня |
| Висота кріплення качана: | середня |
| Кількість рядів: | 16-18 |
| Кількість зерен у ряду: | 36-40 |
| Сума активних Tº до цвітіння: | 900ºC |
| Сума активних Tº до стиглості: | 1760ºC |

**Тип Зерна:** Кремнисто-зубоподібний

**Напрям використання:** Зерно


**Флексибільність качана:** Y- FLEX

**Генетичний потенціал т/га:** 19т

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


БАЛИ 1-9



Посухостійкість
Вологовіддача
Стартовий ріст
Вилягання
No-till та Mini-till
Монокультура

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9



Фузаріоз качана
Пухирчаста сажка
Летаюча сажка

## РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА

| Ранній висів | | | | Пізній висів | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальний агрофон | Відмінний | Добрий | Недостатній | Недостатній | Добрий | Відмінний | Загальний агрофон |
| Насінин на метр* | 5,8 | 5,4 | 5,04 | 4,50 | 4,8 | 5,2 | Насінин на метр* |
| Насінин на Га | 83,333 | 77,777 | 72,222 | 64,444 | 68,888 | 74,444 | Насінин на Га |
| Мішків на Га | 1,15 | 1,07 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 1,03 | Мішків на Га |
| Рослин на Га** | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 58,000 | 62,000 | 67,000 | Рослин на Га** |

*Кількість насіння на метр при інтервалі між рядами 70 см
** Коефіцієнт втрат 10% відноситься до помилок посіву , із середньою схожістю 95%
*** Кількість насіння у посівній одиниці - 72 000

AG seed
ARGENTINA

MAIZ HIBRIDO Y-FLEX

# AG 9320

## ВРОЖАЙНІСТЬ ТА АДАПТИВНІСТЬ

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ ФАО 320

### ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ
завдяки максимальній кількості зерен у ряду

### АДАПТИВНІСТЬ ДО ҐРУНТУ
надає гібриду адаптивність до всіх типів ґрунтів без втрати врожайності

| | |
|---|---|
| Висота рослини: | висока |
| Висота кріплення качана: | середня |
| Кількість рядів: | 16-18 |
| Кількість зерен у ряду: | 36-40 |
| Сума активних Tº до цвітіння: | 940ºC |
| Сума активних Tº до стиглості: | 1860ºC |

**Тип Зерна:** Кремнисто-зубоподібний

**Напрям використання:** Зерно

**Флексибільність качана:** Y-FLEX

**Генетичний потенціал т/га:** 19,5т

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Вологовіддача
- Стартовий ріст
- Вилягання
- No-till та Mini-till
- Монокультура

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Фузаріоз качана
- Пухирчаста сажка
- Летаюча сажка

## РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА

| Ранній висів | | | | | | | Пізній висів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальний агрофон | Відмінний | Добрий | Недостатній | Недостатній | Добрий | Відмінний | Загальний агрофон |
| Насінин на метр* | 5,8 | 5,4 | 5,04 | 4,50 | 4,8 | 5,2 | Насінин на метр* |
| Насінин на Га | 83,333 | 77,777 | 72,222 | 64,444 | 68,888 | 74,444 | Насінин на Га |
| Мішків на Га | 1,15 | 1,07 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 1,03 | Мішків на Га |
| Рослин на Га** | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 58,000 | 62,000 | 67,000 | Рослин на Га** |

*Кількість насіння на метр при інтервалі між рядами 70 см
** Коефіцієнт втрат 10% відноситься до помилок посіву , із середньою схожістю 95%
*** Кількість насіння у посівній одиниці - 72 000

# Озимий ріпак

Вирощування ріпаку потребує обережності, ця рослина вибаглива і до погоди. Ріпак дуже погано реагує на перепади температури, боїться випрівання під снігом і весняних заморозків, вони можуть призвести до відмирання суцвіть. Якщо зима була довгою та холодною, а весною температура різко мінлива – часто “незагартовані” рослини гинуть.

Вибір якісного насіння – це перше завдання перед початком посівної. Вибираючи гібрид чи сорт ріпакового насіння слід звертати увагу на такі показники:

- морозостійкість
- стійкість до шкідників та хвороб
- рівень врожайності
- стійкість до вилягання і осипання
- сортова чистота чи типовість на рівні не менше 97%
- відсутність в насінні карантинних бур'янів

Важливу роль відіграє правильна організація сівозміни. Для ріпаку найкращі попередники ті рослини, які рано вивільняють поле: чорний пар, озимі та ярі зернові, конюшина, люцерна, горох. Після них земля має запаси вологи та корисних речовин. Повертати на те саме місце ріпак можна не раніше ніж за 4 роки. Погано росте ріпак після буряка, який може стати причиною поширення шкідників. А сам ріпак є добрим попередником для більшості рослин, бо він рано звільняє поле і, навіть, покращує стан ґрунту.

Дотримання кліматичних умов – запорука успіху. Ріпак любить вологу, і добре проростає тоді, коли одразу може отримати до 60% води від усієї кількості, це важливо для формування кореневої системи. За перший місяць в ріпаку набирається корінь, стебло росте повільно. Тому не варто зволікати з строками сівби, щоб вологість в ґрунті не падала. Орієнтир вологості: 10-15 мм у десяти сантиметрах ґрунту. Оптимальний календарний термін зазвичай від 15 серпня до 10 вересня.

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗИМОГО РІПАКУ

| | | Класичні гібриди | | | | Clearfield гібриди | | Сорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Назва гібрида | GALAN | BAYO | VENTURA | AZUKAR | AG 7273 | AG 8901 | TROCON |
| Група стиглості | Група стиглості | Ранньо-стиглий | Середньо-ранній | Середньо-ранній | Середньо-стиглий | Середньо-ранній | Ранньо-стиглий | Середньо-ранній |
| | Цвітіння | Раннє | Середньо-раннє | Раннє | Середньо-раннє | Середньо-раннє | Раннє | Раннє |
| | Висота рослини | Середня | Середньо-висока | Середня | Середньо-висока | Середня | Середньо-низька | Середньо-низька |
| Вміст олії | Вміст олії | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 48% |
| Толерантність до обмежуючих факторів під час вегетації | Посухостійкість | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Стійкість до осипання | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| | Стартовий ріст | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| | Вилягання | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| | Зимостійкість | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| | Відновлення вегетації весною | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Циліндро-споріоз | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| | Фомоз | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| | Вертицильоз | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| | Склеротиніоз | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Густота рослин на 1м² до збору | Недостатнє зволоження | 35-45 | 32-42 | 35-45 | 30-40 | 30-40 | 35-45 | 38-48 |
| | Достатнє зволоження | 45-55 | 42-52 | 45-55 | 40-50 | 40-50 | 45-55 | 47-57 |
| Техно-логія | Толерантість до гербицидів | - | - | - | - | Clearfield | Clearfield | - |
| Придатність до різних строків висіву, (-) ранній, (+) пізній | | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + |

Ваш менеджер

Телефон

AG-seed.com.ua

AG seed ARGENTINA

COLZA HIBRIDO

# GALAN

## ЛИЦАР ПІЗНЬОГО ПОСІВУ

РАННЬОСТИГЛИЙ

### ДУЖЕ ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ
урожайності у групі ранньостиглих, чудова зимостійкість

### МАЙСТЕР ПІЗНЬОГО ПОСІВУ
з чудовою початковою енергією роста

Висота рослини: середня
Цвітіння: раннє
Максимальний потенціал т/га: 5,5
Вміст протеїнів: 37%
Вміст олії: 50%
Стійкість до гербіцидів: Classic

| Рекомендована густота до збирання (рослин/м²) | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| | 35-45 | 45-55 |

Адаптований до всіх типів ґрунту

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Стікість до осипання
- Стартовий ріст
- Вилягання
- Зимостійкість
- Відновлення вегетації весною

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Циліндроспоріоз
- Фомоз
- Вертицильоз
- Склеротиніоз

ПРИДАТНІСТЬ ДО РІЗНИХ СТРОКІВ ВИСІВУ

Ранній — Пізній

AG seed
ARGENTINA

COLZA HIBRIDO

# BAYO

## НАЙПОТУЖНІША ЗИМОСТІЙКІСТЬ

СЕРЕДНЬОРАННІЙ

### ГЕНЕТИЧНА ЗИМОСТІЙКІСТЬ
та збалансований весняний розвиток

### ВИСОКА ТА СТАБІЛЬНА ВРОЖАЙНІСТЬ
у різних ґрунтово- кліматичних зонах

Висота рослини: середньовисока
Цвітіння: середньораннє
Максимальний потенціал т/га: 6,2
Вміст протеїнів: 36%
Вміст олії: 50%
Стійкість до гербіцидів: Classic

| Рекомендована густота до збирання (рослин/м²) | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| | 32-42 | 42-52 |

Адаптований до всіх типів ґрунту

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

### АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Стікість до осипання
- Стартовий ріст
- Вилягання
- Зимостійкість
- Відновлення вегетації весною

### ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Циліндроспоріоз
- Фомоз
- Вертицильоз
- Склеротиніоз

### ПРИДАТНІСТЬ ДО РІЗНИХ СТРОКІВ ВИСІВУ

Ранній — Пізній

AG seed
ARGENTINA

COLZA HIBRIDO

# VENTURA

## ДЛЯ СКЛАДНИХ УМОВ

СЕРЕДНЬОРАННІЙ

### ПРИДАТНИЙ ДЛЯ РІЗНИХ УМОВ
різних типів грунтів та технологій обробітку грунту

### ШВИДКИЙ РОЗВИТОК
надземної та підземної частини рослин, можна розширити вікно посіву до більш пізніх термінів

Висота рослини: середня

Цвітіння: раннє

Максимальний потенціал т/га: 6

Вміст протеїнів: 38%

Вміст олії: 50%

Стійкість до гербіцидів: Classic

| Рекомендована густота до збирання (рослин/м²) | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| | 35-45 | 45-55 |

Адаптований до всіх типів ґрунту

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Стікість до осипання
- Стартовий ріст
- Вилягання
- Зимостійкість
- Відновлення вегетації весною

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Циліндроспоріоз
- Фомоз
- Вертицильоз
- Склеротиніоз

ПРИДАТНІСТЬ ДО РІЗНИХ СТРОКІВ ВИСІВУ

Ранній — Пізній

AG seed
ARGENTINA

COLZA HIBRIDO

# AZUKAR

## ВРОЖАЙНІСТЬ ПОНАД УСЕ

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ

### ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ
у різних ґрунтово- кліматичних зонах

### ДЛЯ РАННЬОГО ВИСІВУ
Повільне видовження стебла забезпечує високу стійкість до повернення пізніх весняних приморозків

Висота рослини: середньовисока
Цвітіння: середньораннє
Максимальний потенціал т/га: 6,5
Вміст протеїнів: 37%
Вміст олії: 50%
Стійкість до гербіцидів: Classic

| Рекомендована густота до збирання (рослин/м²) | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| | 30-40 | 40-50 |

Адаптований до всіх типів ґрунту

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Стікість до осипання
- Стартовий ріст
- Вилягання
- Зимостійкість
- Відновлення вегетації весною

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Циліндроспоріоз
- Фомоз
- Вертицильоз
- Склеротиніоз

ПРИДАТНІСТЬ ДО РІЗНИХ СТРОКІВ ВИСІВУ

Ранній — Пізній

AG seed
ARGENTINA

COLZA HIBRIDO

# AG 7273 CL

## МАЙСТЕР ЧИСТИХ ПОЛІВ

СЕРЕДНЬОРАННІЙ

ГІБРИД ПІД ТЕХНОЛОГІЮ CLEARFIELD
для ефективної боротьби з бур'янами

СИЛЬНА ГЕНЕТИКА
надає гібриду стійкість до основних хвороб

Висота рослини: середня
Цвітіння: середньораннє
Максимальний потенціал т/га: 6,2
Вміст протеїнів: 37%
Вміст олії: 50%
Стійкість до гербіцидів: Clearfield® Виробнича система

| Рекомендована густота до збирання (рослин/м²) | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| | 30-40 | 40-50 |

Адаптований до всіх типів ґрунту

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Стікість до осипання
- Стартовий ріст
- Вилягання
- Зимостійкість
- Відновлення вегетації весною

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Циліндроспоріоз
- Фомоз
- Вертицильоз
- Склеротиніоз

ПРИДАТНІСТЬ ДО РІЗНИХ СТРОКІВ ВИСІВУ

Ранній — Пізній

AG seed
ARGENTINA

COLZA HIBRIDO

# AG 8901 CL

НОВА ЗІРКА

РАННЬОСТИГЛИЙ

## ВІДМІННЕ ПОЄДНАННЯ
селекційних досягнень для виробничої системи Clearfield

## ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ
до розтріскування стручків

Висота рослини: середньонизька
Цвітіння: раннє
Максимальний потенціал т/га: 5,7
Вміст протеїнів: 36%
Вміст олії: 50%
Стійкість до гербіцидів: Clearfield® Виробнича система

| Рекомендована густота до збирання (рослин/м²) | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| | 35-45 | 45-55 |

Адаптований до всіх типів ґрунту

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Стікість до осипання
- Стартовий ріст
- Вилягання
- Зимостійкість
- Відновлення вегетації весною

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Циліндроспоріоз
- Фомоз
- Вертицильоз
- Склеротиніоз

ПРИДАТНІСТЬ ДО РІЗНИХ СТРОКІВ ВИСІВУ

Ранній — Пізній

AG seed ARGENTINA

COLZA VARIEDAD

# TROCON

## ПОЦІНОВУВАЧАМ КЛАСИКИ

СЕРЕДНЬОРАННІЙ

### ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ СОРТ
який за продуктивністю випередив навіть гібриди визнаних селекційних брендів

### СТІЙКИЙ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ
особливо до гнилі

Висота рослини: середньонизька
Цвітіння: раннє
Максимальний потенціал т/га: 6
Вміст протеїнів: 38%
Вміст олії: 48%
Стійкість до гербіцидів: Classic

| Рекомендована густота до збирання (рослин/м²) | Нестійке зволоження | Достатнє зволоження |
|---|---|---|
| | 38-48 | 47-57 |

Адаптований до всіх типів ґрунту

Біостимулятор ArPow
- Кращий стартовий ріст
- Краща густота стояння через менші витрати рослин
- Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживних речовин
- Підвищення врожаю у більш ніж 85% випадках на 1-3%

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛИ 1-9

- Посухостійкість
- Стікість до осипання
- Стартовий ріст
- Вилягання
- Зимостійкість
- Відновлення вегетації весною

## ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

БАЛИ 1-9

- Циліндроспоріоз
- Фомоз
- Вертицильоз
- Склеротиніоз

ПРИДАТНІСТЬ ДО РІЗНИХ СТРОКІВ ВИСІВУ

Ранній — Пізній

AG seed
ARGENTINA

# Інноваційна формула для захисту рослин

## СТАНДАРТНА

Біостимулятори: новий склад гумінової кислоти для покращення поглинання поживних речовин, доступних у ґрунті

Фунгіцид: запобігає появі грибка на ранніх фазах росту та захищає сходи

## ПОКРАЩЕНА

Біостимулятор і стандартна формула фунгіциду

Інсектицид: захист Cruiser™ від широкого спектра ґрунтових шкідників, таких як дротяник.

## ПЕРЕВАГИ ПРИ ПОСІВІ ТА ЗБОРУ УРОЖАЯ

### Стартовий ріст

-Швидке проростання
-Кращий рівень сходів у холодних умовах

+4-7% до Вашої врожайності з гектара соняшника

### Коренева система

-Кращий розвиток у ґрунті для продуктивнішого використання води та поживнії речовин

+3-6% до Вашої врожайності з гектара кукурудзи

### Густота рослин

- Краща гомогенність сходів та вирівняність посіву
- Краща густота стояння рослин

+5% до Вашої врожайності з гектара ріпаку

AG seed
ARGENTINA

UNA DECISIÓN INTELIGENTE

# Контакти


м.Київ вул, Михайла
Котельникова 25

Телефон технічної служби
050 880 61 73

agseed@ukr.net