Calidad - Innovación - Servicio

AYUDAMOS A COMPAÑÍAS SEMILLERAS Y AGRICULTORES A SER EXITOSOS

CIS Agro

Somos un grupo de personas comprometidos y apasionados por la agricultura.

cisagro.com.ua

2026



РОЗВИВАЮЧИ ЧИЛІЙСЬКИМ НАСІННЯ ВІД

НОВІ РИНКИ ІЗ ПОРТФОЛІО CIS Agro

Про компанію

Ми - чилійський бізнес, який протягом багатьох років займається виробництвом насіння та продуктів харчування в цілому.

Наш бізнес керується наступними сімейними цінностями:
√ Високі етичні стандарти.
√ Прозорість.
√ Довгострокові відносини.
√ Конфіденційність.
√ Сталий розвиток та турбота про навколишнє середовище.
√ Розвиток наших співробітників та їхніх сімей.

Протягом багатьох років компанія CIS була визнана виробником високоякісної продукції. Це визнання пов'язане з тим, що у нас працює група досвідчених людей, які захоплені сільським господарством.



НАШЕ ГІБРИДІВ

ПОРТФОЛІО СОНЯШНИКА

НАШІ ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ АДАПТИВНІ ДО РІЗНИХ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ

Інновації в гібридах олійного соняшнику зосереджені навколо толерантності до гербіцидів і боротьби з бур'янами; стійкості до вовчка, необхідної для протистояння
цій проблемі в багатьох регіонах вирощування соняшнику, а також стійкості до несправжньої борошнистої роси.

Олійний соняшник класифікують грунтуючись на вмісті олеїнової кислоти (мононенасичені жири). Вибирайте з широкого асортименту лінолевих або високоолеїнових гібридів соняшнику від CIS різних груп стиглості і технологій Clearfield® або Express®.

З CIS Ви можете обрати потрібний гібрид соняшника для своїх цілей. Враховуючи Вашу кліматічну зону, ґрунт та потреби вашого господарства.

Зведена таблиця характеристик гібридів соняшнику

Назва гібрида	Напрям вирощування	Група стиглості	Тип адаптивності	Стійкість до вовчка	Вміст олії	Висота рослини	Потенціал урожайності	Початковий ріст	Стабільність	Посухостійкість	Толерантність до фомопсису	Толерантність до сліротинозу	Комплексна толерантність до хвороб	Рекомендована густота на момент збирання, тис. рослин/га	
														Достатнє зволоження	Недостатнє зволоження
Класичні гібриди															
ФУЕРТЕ	Класичний	Середньоранній	Помірно інтенсивний	A-G	до 54%	Середня	9	8	8	8	8	9	8	50-55	40-45
СКАРЛЄТ	Класичний	Середньоранній	Інтенсивний	A-G*	до 52%	Середня/низька	8	8	9	9	8	8	8	50-60	45-50
Express гібриди															
ФЛОРІАН	Express®	Ранньостиглий	Помірно інтенсивний	A-G	до 50%	Низька/Середня	7	9	8	8	9	8	9	50-55	40-45
АРАКО	Express®	Середньоранній	Екстенсивний	A-G*	до 52%	Низька/Середня	9	8	9	9	8	8	8	55-60	45-50
СОЛАРА	Express®	Середньостиглий	Інтенсивний	A-G	до 54%	Середня	9	7	8	8	7	8	8	50-55	44-50
Високоолеєнові Express гібриди															
АТАМІ	Високоолеїновий (Express®)	Середньоранній	Помірно інтенсивний	A-G	до 52%	Середня	8	8	9	8	8	7	8	50-55	45-50
Clearfield^{R} гібриди															
СЕРЕНО	Clearfield®	Середньоранній	Інтенсивний	A-G*	до 51%	Низька/Середня	8	8	8	9	8	9	9	50-55	45-50
ВІНАЛЬ	Clearfield®	Середньостиглий	Екстенсивний	A-G	до 53%	Середня/Висока	9	7	9	7	8	8	8	50-55	40-45
Clearfield^{R} Plus гібриди															
ПАТРІК	Clearfield® Plus	Середньоранній	Інтенсивний	A-G*	до 52%	Низька/Середня	9	8	8	8	9	8	8	55-60	45-50
Універсальний гібрид															
МОНТАНА	UNI	Середньоранній	Помірно інтенсивний	A-G	до 50%	Низька	8	8	9	9	9	8	9	50-55	40-45

Позначки: 1 бал - низька, 9 балів - висока.

CIS Agro

Унікальне поєднання врожайності та стійкості до посухи, хвороб

ФУЕРТЕ

Висока толерантність до хвороб

Стійкість до вовчку A-G

Висока олійність

Середньоранній гібрид (106 днів)

Технологія Класична

Основні характеристики

Напрям вирощування: Лінолевий
Тип адаптивності: Помірно-інтенсивний
Вміст олії: **54%**
Стійкість до вовчка: A-G
Висота рослин: Середня

Властивості

Потенціал урожайності	**9/9**
Стабільність урожаю	**8/9**
Посухостійкість	**8/9**
Початкові темпи росту	**8/9**

Рекомендації

- Можливе вирощування гібрида в зоні поширення вовчка соняшникового без застосування гербіциду

Толерантність

Комплексна до хвороб	●●●●●●●●○
Фомопсису	●●●●●●●●○
Склеротиніозу	●●●●●●●●●
Вертицильозу	●●●●●●●●○

Особливості


- Гібрид помірно-інтенсивного типу з високим потенціалом урожайності в посушливих умовах
- Адаптований до умов з поширенням вовчка
- Пластичний до різних способів обробітку ґрунту

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	**50-55**	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	**40-45**	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Лісостеп Степ



Гібрид соняшника

CIS Agro

Найкращі врожайність і вміст олії в умовах нових рас вовчка

СКАРЛЕТ

Висока посухостійкість

Стійкість до вовчку A-G

Висока олійність

Середньоранній гібрид (110 днів)

Технологія Класична

Основні характеристики

Напрям вирощування: Лінолевий
Тип адаптивності: Інтенсивний
Вміст олії: **52%**
Стійкість до вовчка: A-G*
Висота рослин: Середня/низька

Властивості

Потенціал урожайності	**8/9**
Стабільність урожаю	**9/9**
Посухостійкість	**9/9**
Початкові темпи росту	**8/9**

Рекомендації

- Можливе вирощування гібрида в зоні поширення вовчка соняшникового без застосування гербіциду

Толерантність

Комплексна до хвороб	●●●●●●●●○
Фомопсису	●●●●●●●●○
Склеротиніозу	●●●●●●●●○
Вертицильозу	●●●●●●●●○

Особливості

- Високоврожайний гібрид інтенсивного типу з доброю початковою енергією росту
- Адаптований до умов з поширенням вовчка
- Висока посухо- та жаростійкість

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	**50-60**	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	**45-50**	тисяч рослин/га


Рекомендована зона вирощування

Лісостеп



Степ





Гібрид соняшника

CIS Agro

Поєднання технології Express та універсального рішення для раннього прибутку

ФЛОРІАН

Стійкість до гербіциду

Стійкість до вовчку A-G

Висока толерантність до хвороб

Ранньостиглий гібрид (87 днів)

Технологія Express

Основні характеристики

Напрям вирощування: Лінолевий
Тип адаптивності: Помірно-інтенсивний
Вміст олії: **50%**
Стійкість до вовчка: A-G
Висота рослин: Низька/середня

Властивості

Потенціал урожайності	**7/9**
Стабільність урожаю	**8/9**
Посухостійкість	**8/9**
Початкові темпи росту	**9/9**

Рекомендації

- Можливе вирощування гібрида в зоні поширення вовчка соняшникового без застосування гербіциду
- Не рекомедовано для дуже ранніх строків посіву

Толерантність

Комплексна до хвороб	●●●●●●●●●
Фомопсису	●●●●●●●●●
Склеротиніозу	●●●●●●●●○
Вертицильозу	●●●●●●●●○

Особливості


- Помірно-інтенсивний гібрид з доброю початковою енергією росту
- Стійкий до вилягання
- Адаптований до умов з поширенням вовчка
- Пластичний до пізніх термінів посіву

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	**50-55**	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	**40-45**	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



Гібрид соняшника

CIS Agro

CIS Agro

Пластичний гібрид з доброю врожайністю та олійністю в умовах посухи

АРАКО

Стійкість до гербіциду

Стійкість до вовчку A-G

Висока посухостійкість

Середньоранній гібрид (106 днів)

Технологія Express

Основні характеристики

Напрям вирощування: Лінолевий
Тип адаптивності: Екстенсивний
Вміст олії: **52%**
Стійкість до вовчка: A-G*
Висота рослин: Низька/середня

Властивості

Потенціал урожайності	**9/9**
Стабільність урожаю	**9/9**
Посухостійкість	**9/9**
Початкові темпи росту	**8/9**

Рекомендації

- Можливе вирощування гібрида в зоні поширення вовчка соняшникового без застосування гербіциду

Толерантність

Комплексна до хвороб	●●●●●●●●○
Фомопсису	●●●●●●●●○
Склеротиніозу	●●●●●●●●○
Вертицильозу	●●●●●●●○○

Особливості


- Екстенсивний гібрид з доброю початковою енергією росту
- Стійкий до вилягання
- Адаптований до умов з поширенням вовчка
- Висока посухо- та жаростійкість

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	**55-60**	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	**45-50**	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Лісостеп Степ



Гібрид соняшника

CIS Agro

CIS Agro

Поєднання технології Express та великого потенціалу врожайності

СОЛАРА

Стійкість до гербіциду

Стійкість до вовчку A-G

Висока олійність

Середньостиглий гібрид (112 днів)

Технологія Express

Основні характеристики

Напрям вирощування: Лінолевий
Тип адаптивності: Інтенсивний
Вміст олії: **54%**
Стійкість до вовчка: A-G
Висота рослин: Середня

Властивості

Потенціал урожайності	**9/9**
Стабільність урожаю	**8/9**
Посухостійкість	**8/9**
Початкові темпи росту	**7/9**

Рекомендації

- Можливе вирощування гібрида в зоні поширення вовчка соняшникового без застосування гербіциду

Толерантність

Комплексна до хвороб	●●●●●●●●○
Фомопсису	●●●●●●●○○
Склеротиніозу	●●●●●●●●○
Вертицильозу	●●●●●●●○○

Особливості


- Гібрид який максимально розкриває свій потенціал за інтенсивної технології вирощування
- Адаптований до умов з поширенням вовчка
- Добра запиленість кошика, зокрема в стресових умовах

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	**50-55**	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	**45-50**	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



Гібрид соняшника

CIS Agro

Поєднання технології Express та високого вмісту олеїнової кислоти

ATAMI

Стійкість до гербіциду

Стійкість до вовчку A-G

Висока олійність та олеїновість

Середньоранній гібрид (108 днів)

Технологія Express

Основні характеристики

Напрям вирощування: Високоолеїновий
Тип адаптивності: Помірно-інтенсивний
Вміст олії: **52%** / до **92%**
Стійкість до вовчка: A-G
Висота рослин: Середня

Властивості

Потенціал урожайності	**8/9**
Стабільність урожаю	**9/9**
Посухостійкість	**8/9**
Початкові темпи росту	**8/9**

Рекомендації

- Дотримуватися рекомендацій щодо вирощування високоолеїнових гібридів
- Не рекомендовано для дуже ранніх строків посіву

Толерантність

Комплексна до хвороб	●●●●●●●●○
Фомопсису	●●●●●●●●○
Склеротиніозу	●●●●●●●○○
Вертицильозу	●●●●●●●●○

Особливості


- Новий високоолеїновий гібрид помірно-інтенсивного типу
- Добра посухо- і жаростійкість
- Адаптований до умов з поширенням вовчка
- Висока стабільність у стресових умовах

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	**50-55**	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	**45-50**	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



Гібрид соняшника

Найкращі врожайність і вміст олії в умовах нових рас вовчка

СЕРЕНО

Стійкість до гербіциду

Стійкість до вовчку A-G

Висока посухостійкість

Середньоранній гібрид (106 днів)

Технологія Clearfield[R]

Основні характеристики

Напрям вирощування: Лінолевий
Тип адаптивності: Інтенсивний
Вміст олії: **51%**
Стійкість до вовчка: A-G*
Висота рослин: Низька/середня

Властивості

Потенціал урожайності	**8/9**
Стабільність урожаю	**8/9**
Посухостійкість	**9/9**
Початкові темпи росту	**8/9**

Рекомендації

- Можливе вирощування гібрида в зоні поширення вовчка соняшникового без застосування гербіциду
- Гербіцид у виробничій системі Clearfield[R] використовувати відповідно до регламентів виробника

Толерантність

Комплексна до хвороб	●●●●●●●●●
Фомопсису	●●●●●●●●○
Склеротиніозу	●●●●●●●●●
Вертицильозу	●●●●●●●●●

Особливості


- Високоврожайний гібрид інтенсивного типу з доброю початковою енергією росту
- Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси
- Висока посухо- та жаростійкість
- Пластичний до термінів посіву

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	**50-55**	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	**45-50**	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Лісостеп Степ



Гібрид соняшника

CIS Agro

Екстенсивний Clearfield^{R} гібрид з найвищою врожайністю у сегменті

ВІНАЛЬ

Стійкість до гербіциду

Стійкість до вовчку A-G

Висока олійність

Середньостиглий гібрид (110 днів)

Технологія Clearfield^{R}

Основні характеристики

Напрям вирощування: Лінолевий
Тип адаптивності: Екстенсивний
Вміст олії: **53%**
Стійкість до вовчка: A-G
Висота рослин: Середня/висока

Властивості

Потенціал урожайності	**9/9**
Стабільність урожаю	**9/9**
Посухостійкість	**7/9**
Початкові темпи росту	**7/9**

Рекомендації

- Можливе вирощування гібрида в зоні поширення вовчка соняшникового без застосування гербіциду
- Гербіцид у виробничій системі Clearfield^{R} використовувати відповідно до регламентів виробника

Толерантність

Комплексна до хвороб	●●●●●●●●○
Фомопсису	●●●●●●●●○
Склеротиніозу	●●●●●●●●○
Вертицильозу	●●●●●●●○○

Особливості


- Екстенсивний Clerafield^{R} гібрид, лідер по врожайності та стабільності
- Висока пластичність і стабільна врожайність
- Середні темпи росту на перших етапах розвитку

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	**50-55**	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	**40-45**	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



Гібрид соняшника

CIS Agro

CIS Agro

Інтенсивний Clearfield^{R}Plus гібрид відмінник високого врожаю

ПАТРІК

Стійкість до гербіциду

Стійкість до вовчку A-G

Висока олійність

Середньоранній гібрид (108 днів)

Технологія Clearfield^{R} Plus

Основні характеристики

Напрям вирощування: Лінолевий
Тип адаптивності: Інтенсивний
Вміст олії: **52%**
Стійкість до вовчка: A-G*
Висота рослин: Низька/середня

Властивості

Потенціал урожайності	**9/9**
Стабільність урожаю	**8/9**
Посухостійкість	**8/9**
Початкові темпи росту	**8/9**

Рекомендації

- Можливе вирощування гібрида в зоні поширення вовчка соняшникового без застосування гербіциду
- Гербіцид у виробничій системі Clearfield^{R} Plus використовувати відповідно до регламентів виробника

Толерантність

Комплексна до хвороб	●●●●●●●●○
Фомопсису	●●●●●●●●●
Склеротиніозу	●●●●●●●●○
Вертицильозу	●●●●●●●●○

Особливості


- Інтенсивний гібрид, лідер по врожайності
- Висока пластичність
- Висока стійкість до несправжньої борошнистої роси і стеблевого вилягання
- Добра стійкість до основних хвороб

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	**55-60**	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	**45-50**	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



Гібрид соняшника

CIS Agro

CIS Agro

Високопродуктивний універсальний гібрид під вашу технологію

МОНТАНА

Стійкість до гербіциду

Стійкість до вовчку A-G

Висока толерантність до хвороб

Середньоранній гібрид (106 днів)

Технологія UNI

Основні характеристики

Напрям вирощування: Лінолевий
Тип адаптивності: Помірно-інтенсивний
Вміст олії: **50%**
Стійкість до вовчка: A-G
Висота рослин: Низька

Властивості

Потенціал урожайності	**8/9**
Стабільність урожаю	**9/9**
Посухостійкість	**9/9**
Початкові темпи росту	**8/9**

Рекомендації

- Можливе вирощування гібрида в зоні поширення вовчка соняшникового без застосування гербіциду
- Може буде використний у виробничій системі Clearfield^{R} або Express

Толерантність

Комплексна до хвороб	●●●●●●●●●
Фомопсису	●●●●●●●●●
Склеротиніозу	●●●●●●●●○
Вертицильозу	●●●●●●●●○

Особливості


- Новий помірно-інтенсивний UNI гібрид для надскладних умов
- Придатний для мінімальної і нульової технологій обробітку ґрунту
- Стабільні урожайність і вихід олії в посушливих умовах
- Добра стійкість до основних хвороб

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	**50-55**	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	**40-45**	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Лісостеп Степ



Гібрид соняшника

CIS Agro




НАШЕ ГІБРИДІВ

ПОРТФОЛІО КУКУРУДЗИ

НАШІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ АДАПТИВНІ ДО РІЗНИХ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ

В процесі виробництва насіння, після збору врожаю, проходить очищення, розділення за розміром (калібрування), професійну обробку інсектицидами, гербіцидами та фунгіцидами, пакування в мішки і, нарешті, відправка в торговельну мережу. Крім того, ми маємо власну лабораторію, де за стандартами ISTA здійснюється контроль якості, щоб гарантувати, що насіння, яке потрапляє до наших клієнтів, має оптимальну якість для посіву. У нашій лабораторії проводяться такі аналізи: енергія проростання, схожість, тест на життєздатність, холодовий тест, тест Fast Green, гіпохлоритний тест, визначення наявності генів та аналіз чистоти RR.

Ми вже кілька років працюємо над покращенням якості кожного з цих процесів, оскільки вважаємо, що вони мають фундаментальне значення для отримання високоякісного насіння. Наше головне завдання полягає в тому, щоб продукція потрапляла до наших клієнтів з відмінною якістю.



Зведена таблиця характеристик гібридів кукурудзи

Назва гібрида	Напрям вирощування	Група стиглості, ФАО	Тип адаптивності	Тип Зерна	Віддача вологи	Посухостійкість	Холодостійкість	Мінімальний обробіток	Монокультура	Стійкість до: летючої сажки	Стійкість до: пухирчастої сажки	Стійкість до: кореневих і стеблових гнилей	Рекомендована густота на момент збирання, тис. рослин/га: Достатнє зволоження	Рекомендована густота на момент збирання, тис. рослин/га: Недостатнє зволоження
Класичні гібриди														
ВІЄНТО	Зерно, силос	Ранньостиглий ФАО 210	Інтенсивний	Зуб	●○○	●●○	●●●	–	+	8	8	9	75-80	65-70
РІО	Зерно	Середньоранній ФАО 250	Середньо-пластичний	Кр-зуб	●●●	●●○	●●○	–	+	8	8	7	70-80	65-70
ФУЕГО	Зерно	Середньоранній ФАО 290	Високо-адаптивний	Кр-зуб	●●●	●●●	●○○	+	–	7	8	7	65-75	55-65
СУЕНО	Зерно	Середньостиглий ФАО 320	Інтенсивний	Зуб	●●○	●●●	●●○	+	+	8	8	9	65-75	55-65
КОЙКЕ	Зерно	Середньостиглий ФАО 340	Середньо-пластичний	Зуб	●●●	●●○	●●●	–	–	8	9	8	65-70	55-60
РОККО	Зерно	Середньопізній ФАО 370	Середньо-пластичний	Кр-зуб	●●○	●●●	●●○	+	–	8	8	8	60-65	55-60

Позначки
1 бал - низька
9 балів - висока

добра ●○○
дуже добра ●●○
відмінна ●●●

\+ Так
– Ні



Бали 1-9

CIS Agro

Ранньостиглість, продуктивність та стійкість до стеблового полягання

ВІЄНТО

Високий урожай

Висока толерантність до хвороб

Ранньостиглий гібрид (ФАО 210)

Основні характеристики

Використання: Зерно, Силос
Тип адаптивності: Інтенсивний
Тип зерна: Зубоподібний

Властивості

Мінімальний обробіток	Ні
Придатність до монокультури	Так
Віддача вологи	●○○
Посухостійкість	●●○
Холодостійкість	●●●

Рекомендації

- Післясходові гербіциди застосовувати лише відповідно до фаз розвитку культури
- Придатний до всіх строків посіву

Стійкість

До летючої сажки	●●●●●●●●○
До пухирчастої сажки	●●●●●●●●○
До кореневих і стеблових гнилей	●●●●●●●●●

Особливості


- Високоврожайний скоростиглий гібрид, дозволяє отримати ранній урожай зерна й поживного силосу
- Трилінійний гібрид із покращеною адаптивністю
- Здатний забезпечити високу окупність витрат на вирощування

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	75-80	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	65-70	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



Потужний і стабільний для високого врожаю

PIO

Високий урожай

Добра вологовіддача

Середньоранній гібрид (ФАО 250)

Основні характеристики

Використання: Зерно
Тип адаптивності: Середньопластичний
Тип зерна: Кремнисто-зубоподібний

Властивості

Мінімальний обробіток	Ні
Придатність до монокультури	Так
Віддача вологи	●●●
Посухостійкість	●●○
Холодостійкість	●●○

Рекомендації

- Післясходові гербіциди застосовувати лише відповідно до фаз розвитку культури
- Висівати в оптимальні строки

Стійкість

До летючої сажки	●●●●●●●●○
До пухирчастої сажки	●●●●●●●●○
До кореневих і стеблових гнилей	●●●●●●●○○

Особливості

- Високий потенціал урожаю, швидка вологовіддача зерна в період дозрівання
- Придатний для вирощування в зонах нестійкого зволоження
- Високі показники стартового росту

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	70-80	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	65-70	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



CIS Agro

Стабільна врожайність та відмінна посухостійкість

ФУЕГО

Високий урожай

Добра вологовіддача

Добра посухостійкість

Середньоранній гібрид (ФАО 290)

Основні характеристики

Використання: Зерно
Тип адаптивності: Високоадаптивний
Тип зерна: Кремнисто-зубоподібний

Властивості

Мінімальний обробіток	Так
Придатність до монокультури	Ні
Віддача вологи	●●●
Посухостійкість	●●●
Холодостійкість	●○○

Рекомендації

- Післясходові гербіциди застосовувати лише відповідно до фаз розвитку культури
- Придатний до всіх строків посіву

Стійкість

До летючої сажки	●●●●●●●○○
До пухирчастої сажки	●●●●●●●●○
До кореневих і стеблових гнилей	●●●●●●●○○

Особливості


- Гібрид високоврожайний і посухостійкий
- Швидкий ріст на початку вегетації
- Вміст білка в зерні становить 8,8-9,4 %, крохмалю 73-74%

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	65-75	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	55-65	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



CIS Agro

Гарантований дохід за мінливих умов

СУЕНО

Високий урожай

Висока толерантність до хвороб

Добра посухостійкість

Середньостиглий гібрид (ФАО 320)

Основні характеристики

Використання: Зерно
Тип адаптивності: Інтенсивний
Тип зерна: Зубоподібний

Властивості

Мінімальний обробіток	Так
Придатність до монокультури	Так
Віддача вологи	●●○
Посухостійкість	●●●
Холодостійкість	●●○

Рекомендації

- Післясходові гербіциди застосовувати лише відповідно до фаз розвитку культури
- Висівати в оптимальні строки

Стійкість

До летючої сажки	●●●●●●●○
До пухирчастої сажки	●●●●●●●○
До кореневих і стеблових гнилей	●●●●●●●●

Особливості

- Висока і стабільна врожайність
- Високий рівень посухостійкості
- Високі показники стійкості до хвороб
- Стійкий до прикореневого і стеблового вилягання

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	70-75	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	50-55	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Полісся Лісостеп



Стабільність, урожайність та прибутковість

КОЙКЕ

Високий урожай

Добра вологовіддача

Середньостиглий гібрид (ФАО 340)

Основні характеристики

Використання: Зерно
Тип адаптивності: Середньопластичний
Тип зерна: Зубоподібний

Властивості

Мінімальний обробіток	Ні
Придатність до монокультури	Ні
Віддача вологи	●●●
Посухостійкість	●●○
Холодостійкість	●●●

Рекомендації

- Післясходові гербіциди застосовувати лише відповідно до фаз розвитку культури
- Добре реагує на високий агрофон та інтенсивну технологію

Стійкість

До летючої сажки	●●●●●●●●○
До пухирчастої сажки	●●●●●●●●●
До кореневих і стеблових гнилей	●●●●●●●●○

Особливості

- Стабільний гібрид зі швидким ростом на початку вегетації
- Потужна коренева система, добре використовує природну родючість ґрунту
- Висока рослина з високим кріпленням качана

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	65-70	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	50-60	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



Максимально ефективне використання наявної вологи

РОККО

Високий урожай

Добра вологовіддача

Добра посухостійкість

Середньопізній гібрид (ФАО 370)

Основні характеристики

Використання: Зерно
Тип адаптивності: Середньопластичний
Тип зерна: Кремнисто-зубоподібний

Властивості

Мінімальний обробіток	Так
Придатність до монокультури	Ні
Віддача вологи	●●○
Посухостійкість	●●●
Холодостійкість	●●○

Рекомендації

- Післясходові гербіциди застосовувати лише відповідно до фаз розвитку культури
- Уникати загущення та пізнього збирання

Стійкість

До летючої сажки	●●●●●●●●○
До пухирчастої сажки	●●●●●●●●○
До кореневих і стеблових гнилей	●●●●●●●●○

Особливості


- Високий потенціал урожайності в умовах помірного стресу
- Висока натура зерна
- Еректоїдний тип розміщення листків
- Висока стійкість до кореневого полягання

Рекомендована густота рослин на період збирання

Достатнє зволоження	60-65	тисяч рослин/га
Недостатнє зволоження	55-60	тисяч рослин/га

Рекомендована зона вирощування

Лісостеп Степ





ПОРТФОЛІО РІПАКУ

НАШІ ГІБРИДИ РІПАКУ АДАПТИВНІ ДО РІЗНИХ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ

Переваги вирощування ріпаку полягають у його високій харчовій, промисловій та агрономічній цінності:

Стимулювання врожайності пшениці. Як попередник, він сприяє підвищенню аерації ґрунту та акумуляції вологи. Пшениця, висіяна на ділянках після нього, збільшує свою врожайність на 10-30%. Цінний як сидерат, адже підвищує вміст органічної речовини в ґрунті так само, як перегній у кількості 10-15 т/га.

На врожайність ріпаку впливає одразу кілька чинників:
- агрокліматичні умови ділянки
- сортові характеристики насіння
- строки сівби ріпаку
- густота посівів

При вирощуванні озимого ріпаку, треба дотримуватися строгих умов

Зведена таблиця характеристик гібридів озмого ріпаку

Назва гібрида	Напрям вирощування	Розвиток восени	Цвітіння	Урожайність	Олійність	Посухостійкість	Зимостійкість	Початковий ріст	вилягання	Стійкість до фомозу	Стійкість до Циліндроспоріозу	Стійкість до Осипання	Рекомендовані строки посіву: Ранні	Оптимальні	Пізні
Класичні гібриди															
ПАТО	Класичний	Швидкий	Раннє	●●○	●●○	●●○	●●●	9	8	7	7	9	○○○	●●●	●●●
ІМПЕРІО	Класичний	Середній	Середньораннє	●●●	●●●	●●○	●●●	8	9	8	7	8	○○●	●●●	●●○
МАРКІЗ	Класичний	Повільний	Середнє	●●●	●●○	●●●	●●○	7	9	8	8	9	●●●	●●●	○○○
Clearfield^{R} гібриди															
ЧІЛІКС	Clearfield^{R}	Повільний	Середнє	●●○	●●○	●●●	●●○	7	9	6	7	8	○●●	●●●	●○○
МАРІНЕР	Clearfield^{R}	Швидкий	Раннє	●●●	●●●	●●○	●●○	8	8	7	8	9	○○○	●●●	●●●
Express гібриди															
КАСПЕР	Express	Середній	Середньораннє	●●○	●●○	●●●	●●●	8	8	8	8	9	○●●	●●●	●○○

Позначки
1 бал - низька
9 балів - висока

добра ●○○ дуже добра ●●○ відмінна ●●●

Бали 1-9



Універсальність, коли немає часу, та стабільність

ПАТО

Висока врожайність

Зимостійкість

Висока толерантність до хвороб

Класичний гібрид

Основні характеристики

Розвиток восени: Швидкий
Цвітіння: Раннє
Реакція на рістрегулятори: Добра
Висота рослин: Середня

Властивості

Урожайність	8/9
Олійність	8/9
Посухостійкість	8/9
Зимостійкість	9/9
Початковий ріст	9/9

Рекомендації

- Гібрид добре витримує зрідження. Загущення слід уникати навіть за пізньої сівби
- Можливий висів в дуже пізні сроки

Стійкість до

Вилягання	●●●●●●●●○
Фомозу	●●●●●●●○○
Циліндроспоріозу	●●●●●●●○○
Осипання	●●●●●●●●●

Особливості

- Високий потенціал врожайності та олійності
- Стабільність гібриду
- Активний розвиток на етапі сходів, навіть при високій температурі ґрунту

Строки та норми висіву

Ранні	-- - --	схожих насінин/м^2
Оптимальні	35-40	
Пізні	40-45	

Норми висіву вказанні для вузького міжрядця 12,5-15 см

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



Гібрид озимого ріпаку

CIS Agro

Висока врожайність без компромісів

ІМПЕРІО

Висока врожайність

Зимостійкість

Широке вікно посіву

Класичний гібрид

Основні характеристики

Розвиток восени: Середній
Цвітіння: Середньораннє
Реакція на рістрегулятори: Відмінна
Висота рослин: Низька

Властивості

Урожайність	9/9
Олійність	9/9
Посухостійкість	8/9
Зимостійкість	9/9
Початковий ріст	8/9

Рекомендації

- Рекомендований для всіх кліматичних зон вирощування ріпаку
- Придатний для посіву з широким міжряддям

Стійкість до

Вилягання	●●●●●●●●●
Фомозу	●●●●●●●●○
Циліндроспоріозу	●●●●●●●○○
Осипання	●●●●●●●●○

Особливості

- Ефективне використання запасів вологи
- Не схильний до вилягання
- Синхронне дозрівання стручків забезпечує якісний обмолот без втрат
- Висока ефективність засвоєння азотного живлення

Строки та норми висіву

Ранні	35-40	схожих насінин/м^2
Оптимальні	40-50	
Пізні	50-55	

Норми висіву вказанні для вузького міжряддя 12,5-15 см

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ

○●●●●●●●●

Гібрид озимого ріпаку

CIS Agro

CIS Agro

Достойний результат без промахів

МАРКІЗ

Висока врожайність

Посухостійкість

Стійкий до розтріскування

Класичний гібрид

Основні характеристики

Розвиток восени: Повільний
Цвітіння: Середнє
Реакція на рістрегулятори: Добра
Висота рослин: Низька/середня

Властивості

Урожайність	9/9
Олійність	8/9
Посухостійкість	9/9
Зимостійкість	8/9
Початковий ріст	7/9

Рекомендації

- Рекомендований для всіх кліматичних зон вирощування ріпаку
- Придатний для ранніх термінів сівби

Стійкість до

Вилягання	●●●●●●●●●
Фомозу	●●●●●●●●○
Циліндроспоріозу	●●●●●●●●○
Осипання	●●●●●●●●●

Особливості

- Висока врожайність та добра олійність
- Не схильний до вилягання
- Стриманий розвиток у весняний період
- Не потребує високих морфо-регуляторів восени

Строки та норми висіву

Ранні	35-40	схожих насінин/м²
Оптимальні	45-50	
Пізні	-- - --	

Норми висіву вказанні для вузького міжрядця 12,5-15 см

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



Гібрид озимого ріпаку

CIS Agro

CIS Agro

Гібрид, який нівелює кліматичні ризики

ЧІЛІКС

Добра врожайність

Посухостійкість

Стійкість до гербіциду

Гібрид під технологію Clearfield^{R}

Основні характеристики

Розвиток восени: Повільний
Цвітіння: Середнє
Реакція на рістрегулятори: Відмінна
Висота рослин: Низька/середня

Властивості

Урожайність	8/9
Олійність	8/9
Посухостійкість	9/9
Зимостійкість	8/9
Початковий ріст	7/9

Рекомендації

- Рекомендовано уникати дуже пізніх термінів сівби в південних та інших областях України
- За раннього посіву може висіватися на легких піщаних ґрунтах із застосуванням азотних та фосфорних добрив

Стійкість до

Вилягання	●●●●●●●●●
Фомозу	●●●●●●○○○
Циліндроспоріозу	●●●●●●●○○
Осипання	●●●●●●●●○

Особливості

- Низькорослий гибрид, для виробничої системи Clearfield^{R}
- Висока посухостійкість
- Стриманий розвиток у весняний період
- Придатний для різних типів ґрунтів та технологій обробітку ґрунту
- Широке вікно посіву

Строки та норми висіву

Ранні	35-40	схожих насінин/м^2
Оптимальні	45-50	
Пізні (лише для півдня)	50-60	

Норми висіву вказанні для вузького міжряддя 12,5-15 см

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



Гібрид озимого ріпаку

CIS Agro

CIS Agro

Гібрид для високих показників урожайності, виробничої системи Clearfield®

МАРІНЕР

Висока врожайність

Майстер пізнього посіву

Стійкість до гербіциду

Гібрид під технологію Clearfield®

Основні характеристики

Розвиток восени: Швидкий
Цвітіння: Раннє
Реакція на рістрегулятори: Добра
Висота рослин: Середня/висока

Властивості

Урожайність	9/9
Олійність	9/9
Посухостійкість	8/9
Зимостійкість	8/9
Початковий ріст	8/9

Рекомендації

- Добре підходить для широкорядного посіву та посіву з одночасним рихленням
- Рекомендований для всіх кліматичних зон вирощування ріпаку

Стійкість до

Вилягання	●●●●●●●●○
Фомозу	●●●●●●●○○
Циліндроспоріозу	●●●●●●●●○
Осипання	●●●●●●●●●

Особливості

- Активний осінній розвиток як підземної так і надземної маси рослин
- Висока потенційна врожайність та компенсаційний потенціал
- Придатний для різних типів ґрунтів та технологій обробітку ґрунту
- Потужна корнева система

Строки та норми висіву

Ранні	-- - --	схожих насінин/м²
Оптимальні	45-50	
Пізні	50-55	

Норми висіву вказанні для вузького міжряддя 12,5-15 см

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ

●●●●●●●●●

Гібрид озимого ріпаку

CIS Agro

CIS Agro

Потужний, здоровий та продуктивний гібрид

КАСПЕР

Добра врожайність

Широке вікно посіву

Стійкість до гербіциду

Гібрид під технологію Express

Основні характеристики

Розвиток восени: Середній
Цвітіння: Середньораннє
Реакція на рістрегулятори: Добра
Висота рослин: Низька/середня

Властивості

Урожайність	8/9
Олійність	8/9
Посухостійкість	9/9
Зимостійкість	9/9
Початковий ріст	8/9

Рекомендації

- Добре підходить для широкорядного посіву та посіву з одночасним рихленням
- Рекомендований для всіх кліматичних зон вирощування ріпаку

Стійкість до

Вилягання	●●●●●●●●○
Фомозу	●●●●●●●●○
Циліндроспоріозу	●●●●●●●●○
Осипання	●●●●●●●●●

Особливості

- Синхронне дозрівання стручків забезпечує якісний обмолот без втрат
- Дуже добра посухо та морозостійкість
- Придатний для різних типів ґрунтів та технологій обробітку ґрунту
- Стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил 50 г/га

Строки та норми висіву

Ранні	35-40	схожих насінин/м^2
Оптимальні	40-50	
Пізні	50-55	

Норми висіву вказанні для вузького міжрядця 12,5-15 см

Рекомендована зона вирощування

Полісся | Лісостеп | Степ



Гібрид озимого ріпаку

CIS Agro

ПРО НАС

CIS є чилійською компанією, лідером на місцевому ринку з виробництва основного та комерційного насіння сезонних культур, як кукурудза, соя, соняшник, ріпак, цукрова кукурудза тощо. Зараз ми виробляємо для різних клієнтів по всьому світу.

Якість - Інновації - Сервіс

ПЕРЕВАГИ ВИРОБНИЦТВА В ЧІЛІ

Факт використання південної півкулі як контрсезонного виробництва дозволяє виробляти два врожаї за один рік.
Технічні причини, які дозволяють нам таку можливість:

√ Відповідний ґрунт і умови освітлення
√ Низький рівень зараження шкідниками та хворобами завдяки переважаючому середземноморському клімату.
√ Температура від 9°C (вночі) до 28°C (вдень) протягом сезону посадки.
√ Наявність води для поливу.
√ Географічна ізоляція (пустеля на півночі, гори Анди на сході, антарктичний лід на півдні та Тихий океан на заході).
√ Міжнародне визнання роботи нашої влади від Міністерства сільського господарства через Службу сільського господарства та тваринництва (SAG).
√ Відмінний технічний рівень, інфраструктура та чітке насіннєве законодавство.
√ Прості та швидкі процедури та правила імпорту та експорту.
√ Хороший рівень фермерів, агрономів та техніків.
√ ANPROS (Національна асоціація виробників насіння) має систему GPS, яка через Інтернет дозволяє контролювати посівні поля інших компаній та встановлювати відповідні ізоляції.
√ Чилі дозволено сертифікувати відповідно до стандартів OECD і є членом UPOV із захисту прав селекціонерів.

ЩО МИ РОБИМО

Ми виробляємо та продаємо насіння та продукти харчування найвищої якості, щоб зробити доступними для наших фермерів найкращі сорти та гібриди, доступні на ринку, залежно від географічної реальності, типу ґрунту та клімату.

CIS Agro